



# CARTILLA DE VACUNACIÓN

## CARTA DE VACINAÇÃO

Número y Centro de Salud  
Número e Centro de Saúde

Nombre / Nome

---

Sexo

M

F

---

Fecha de nacimiento / Data de nascimento

---

Dirección / Endereço

---

Doses		Calendario/ Calendário	Fecha de vacunacion Data de vacinação	Número de lote Lote nº
BCG		Al nacimiento ( lo antes posible, max 12 meses) Ao nascer (o mais cedo possível, max 12 meses)		
Hepatitis B / Hépatite B Monovalente	0	Al nacimiento ( lo antes posible) <sup>1</sup> Ao nascer (o mais cedo possível,) <sup>2</sup>		
Poliomielitis Oral (VPO) Pólio Oral (OPV)	0	Al nacimiento ( lo antes posible , max 2 sem.) Ao nascer (o mais cedo possível, max 2 sem.)		
Poliomielitis Oral (VPO) Pólio Oral (OPV)	1	A partir de 6 sem. [intervalo min 4 sem. después de VPO0] A partir de 6 sem. [min 4 sem. após OPV 0]		
Poliomielitis Oral (VPO) Pólio Oral (OPV)	2	Mínimo 4 sem. después de VPO 1 Mínimo 4 sem. após OPV 1		
Poliomielitis Oral (VPO) Pólio Oral (OPV)	3	Mínimo 4 sem. después de VPO 2 Mínimo 4 sem. após OPV 2		
Poliomielitis Oral (VPO) refuerzo Pólio Oral (OPV) reforço		De acuerdo al calendario De acordo com o calendário		
Poliomielitis Inyectable (VPI) Pólio injetável (VIP)		De acuerdo com o calendário De acordo al calendario		
Pentavalente (DTP/ HepB/Hib) 1 Pentavalente (DPT/HepB/Hib)	1	A partir de 6 sem. A partir de 6 sem.		
Pentavalente (DTP/ HepB/Hib) 2 Pentavalente (DPT/HepB/Hib)	2	Mínimo 4 sem. <sup>3</sup> después de DTP/ HepB/Hib 1 Mínimo 4 sem. <sup>4</sup> após DPT/HepB/Hib 1		
Pentavalente (DTP/ HepB/Hib) 3 Pentavalente (DPT/HepB/Hib)	3	Mínimo 4 sem. <sup>5</sup> después de DTP/ HepB/Hib 2 Mínimo 4 sem. <sup>6</sup> após DPT/HepB/Hib 2		
Pentavalente (DTP/HepB/Hib) / refuerzo / reforço		De acuerdo al calendario ( máximo 6 años ) De acordo com o calendário (máximo 6 anos)		
Vacuna Neumococo conjugada Vacina Neumococo conjugada	1	A partir de 6 sem. A partir de 6 sem.		
Vacuna Neumococo conjugada Vacina Neumococo conjugada	2	De acuerdo al calendario De acordo com o calendário		
Vacuna Neumococo conjugada Vacina Neumococo conjugada	3	De acuerdo al calendario De acordo com o calendário		
Rotavirus 1		De acuerdo al calendario De acordo com o calendário		
Rotavirus 2		De acuerdo al calendario De acordo com o calendário		
Rotavirus 3		De acuerdo al calendario De acordo com o calendário		
Vacuna sarampión o combinada rubeola y parotiditis (SRP) Vacina contra o sarampo	0	A partir de 6 meses ( en contextos específicos ) A partir de 6 meses (em contextos específicos)		
Vacuna sarampión o combinada rubeola y parotiditis (SRP) Vacina contra o sarampo	1	A partir de 9 meses [ Min 4 sem. después de SRP 0] A partir de 9 meses [min 4 sem. depois VSPG 0]		
Measles containing vaccine Vaccin contenant la rougeole	2	Min 4 sem. después de SRP1 Mínimo 4 sem. depois VSPG 1		
Fiebre Amarilla Febre Amarela		A partir de 9 meses A partir de 9 meses		
Otra / Outra: Fecha / Data:		Otra / Outra: Fecha / Data:	Otra / Outra: Fecha / Data:	
Tetano Tétanos	Fecha / Data:	Fecha / Data:	Fecha / Data:	Fecha / Data:
Vitamina A Vitamine A	Fecha / Data:	Fecha / Data:	Fecha / Data:	Fecha / Data:

1 - y hasta la primera dosis de pentavalente (DTP/HepB/Hib 1) 4 - 4 a 8 semanas

2 - e até a primeira dose de Pentavalente (DTP/HepB/Hib1) 5 - De 6 a 12 meses si DTP/ HepB/Hib 1 > 11 meses

3 - 4 a 8 semanas

6 - 6-12 meses se DPT/HepB/Hib 1 > 11 meses